


ESCALA ESPECÍFICA PARA EL DOLOR DE HOMBRO:



DOLOR	Puntos
• Presente todo el tiempo e intolerable. Necesita medicamentos fuertes frecuentemente.	1
• Presente todo el tiempo, pero tolerable. Toma medicamentos fuertes ocasionalmente.	2
• Ninguno o ligero en reposo, pero presente durante las actividades ligeras. Toma aspirina frecuentemente.	4
• Presente sólo durante las actividades pesadas o intensas. Aspirina ocasional.	6
• Ocasional y ligero.	8
• Ninguno.	10
 FUNCIÓN	
• Imposibilitado para usar la extremidad.	1
• Posible solo actividades ligeras.	2
• Puede hacer pequeños trabajos caseros en la mayoría de las actividades de la vida diaria.	4
• Habil para hacer más trabajos caseros, ir de compras, manejar, peinarse y vestirse.	6
• Ligera restricción. Puede hacer labores por encima del hombro.	8
• Actividad normal.	10
 FLEXIÓN ANTERIOR ACTIVA	
• 150 grados o más.	5
• 120 a 150 grados.	4
• 90 a 120 grados.	3
• 45 a 90 grados.	2
• 30 a 45 grados.	1
• Menos de 30 grados.	0

FUERZA MUSCULAR PARA LA FLEXIÓN (*test manual*)

• Grado 5	5
• Grado 4	4
• Grado 3	3
• Grado 2	2
• Grado 1	1
• Grado 0	0

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE

• Mejoramiento o satisfacción	5
• Empeoramiento	0

CALIFICACIÓN TOTAL: _____ puntos

Cabrera Viltres N, Salles Betancourt G, Bernal González M, Álvarez Placeres L, Marrero Riverón LO, Espinosa Tejeda N. Tratamiento de descompresión subacromial en el síndrome de pinzamiento anterior del hombro. Rev Cubana Ortop Traumatol 2004; 18(1)